

Impftermine für Ihr Kind

auf Basis des Impfkalenders der STIKO für Säuglinge, Kinder und Jugendliche ¹

Vaccination schedule
in 20 languages →



Landkreis Cuxhaven | Gesundheitsamt
Vincent-Lübeck-Str. 2 | 27474 Cuxhaven
www.landkreis-cuxhaven.de

Impfungen gegen	Alter in Wochen ⁵	Vollendeter Lebensmonat ^{2, 3, 4}					Vollendetes Lebensjahr ^{2, 3, 4}	
	6	2	3	4	11 – 14	15 – 23	5 – 6	9 – 17
Rotaviren	1. Impfung ⁵	2. Impfung	(3. Impfung)					
Grundimmunisierung * – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten (Pertussis) – Kinderlähmung (Polio) – Hepatitis B – Hib (H. influenzae Typ b)		1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung		Auffrischimpfung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten	Auffrischimpfung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten – Kinderlähmung
Pneumokokken ⁸		1. Impfung		2. Impfung	3. Impfung			
Grundimmunisierung ** – Masern – Mumps – Röteln – Windpocken					1. Impfung	2. Impfung		
Meningokokken C					Impfung ab dem vollendeten 12. Lebensmonat			
Hepatitis B								Nachholimpfung
HPV ^{6, 7}								Standard- / bzw. Nachholimpfung

1 Empfehlung des Gesundheitsamtes des Landkreises Cuxhaven auf Basis der Impfpfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2017, Quelle: Epidemiologisches Bulletin Nr. 34, Robert Koch-Institut mit Ergänzungen

2 Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden.

3 Alle Impfungen, der Mindestabstand zwischen den Impfungen sowie die zeitgleiche Gabe mit anderen Impfstoffen sollte gemäß STIKO-Empfehlungen und/oder Herstellerangaben erfolgen.

4 Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensmonats/-jahres.

5 Die erste Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem

Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

6 Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Dosen, bei Nachholimpfung beginnend ab einem Alter von 15 Jahren 3 Dosen.

7 Bis zum vollendeten 17. Lebensjahr sollten versäumte Impfungen gegen HPV nachgeholt werden.

8 Frühgeborene (Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche) sollten mit insgesamt 4 Impfstoffdosen im Alter von 2, 3, 4 und 11 – 14 Monaten (3 + 1 Impfschema) geimpft werden.

* möglich mit 6-fach-Kombinationsimpfstoff

** möglich mit 4-fach-Kombinationsimpfstoff